La douleur

The pain

Résumé

MOTS-CLEFS :

- Douleur, récepteurs de la douleur, régulation

KEYWORDS:

- Pain, pain receptors, regulation

La douleur est très souvent présente en odonto-stomatologie. C'est une entité biologique avec ses récepteurs propres, ses circuits d'intégration et surtout la régulation de sa transmission par les centres supérieurs. La connaissance de ces mécanismes va permettre de mieux la comprendre et d'en faciliter le traitement symptomatique.

Abstract

The pain is very often present in odonto-stomatology. It is a biological entity with its appropriate receptors, its circuits of integration and especially the regulation of its transmission by the superior centers. The knowledge of these mechanisms will make it possible to better understand it and facilitate the symptomatic treatment.

AOS n° 281 – 2017

► **Marc BERT**, DCD, DSO, Lauréat de l'Université René Descartes, Membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, Expert Honoraire près la Cour d'Appel de Paris.

Nos métiers sont confrontés en permanence avec la douleur, qu'elle soit aiguë comme lors d'une pulpite, de fond comme liée à une contracture musculaire ou chronique, souvent constatée lors de nombreuses pathologies occlusales. Une définition de la douleur a été donnée en 1979 par l'International Association for the Study of Pain : « *La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion* ».

Dès 1911, Head différenciait deux types de douleurs :

- la douleur épicrotique, de tonalité nette et précise ;
- la douleur protopathique, mal définie, et de localisation plus floue.

La compréhension des mécanismes d'intégration neurophysiologiques des différents types de douleur va permettre de comprendre leur origine afin d'adapter un traitement symptomatique et non plus d'appliquer des « recettes » mal comprises, donc inefficaces.

Il existe de plus certains effets d'origine purement psychiques comme l'effet placebo qui ne peuvent se comprendre que par l'étude des mécanismes de régulation de la douleur, ainsi que la « douleur-maladie »

où la peur de l'apparition de la douleur génère en elle-même une douleur psychique.

Enfin, la douleur est un signal d'alerte de l'organisme de la présence d'un dysfonctionnement quelconque. L'insensibilité congénitale à la douleur, maladie génétique avec un mode de transmission autosomique récessif ou dominant, expose à de nombreux dangers avec des risques de traumatismes passant inaperçus, surtout chez le nourrisson et le jeune enfant.

LA NOCICEPTION

La nociception est la perception douloureuse. Les récepteurs en sont les terminaisons libres, très arborisées et les voies sont soit des fibres amyéliniques à conduction lente, de type C, soit des fibres à conduction plus rapide Aδ. Les stimuli nociceptifs peuvent être thermiques (> 45 °C), mécaniques ou chimiques (pH acide, histamine...). Les récepteurs se trouvent pratiquement dans tout le corps : peau, os, muscles, organes internes, sauf dans le cerveau, à l'exception des méninges. Les voies de la conduction nociceptive

sont essentiellement les voies spinothalamiques et les voies extralemniscales.

Les stimuli nociceptifs

Il existe un grand polymorphisme des stimuli dologènes (Fig. 1). Mamo (1978) signale que le seul caractère vraiment commun à l'ensemble des stimulations nociceptives serait la libération ou l'activation d'un intermédiaire chimique d'origine tissulaire, « *ultime maillon entre la cause et l'effet* ». Cet auteur en distingue plusieurs :

- ▶ l'histamine, prurigineuse à faible dose, peut déterminer des sensations douloureuses à des doses plus élevée. L'histamine joue un rôle essentiel dans le développement de l'oedème ;
- ▶ l'acétylcholine, qui n'est pas un agent dologène mais abaisse le seuil d'excitabilité des récepteurs. Une agression d'intensité sous-liminaire peut devenir active par son intervention ;
- ▶ la sérotonine, qui détermine des sensations douloureuses à faible dose et semble impliquée dans la céphalée migraineuse ;
- ▶ le chlorure de potassium (K⁺), au rôle d'intermédiaire chimique contesté au niveau des récepteurs, mais très actif au niveau des sensations douloureuses musculaires ;
- ▶ la bradykinine, à l'origine d'une douleur intense 14 secondes après son injection cutanée et dont l'effet dure plus d'une minute, provoquant une douleur comparable à celle d'un traumatisme sévère. La bradykinine stimule essentiellement les fibres sensibles de petit calibre, myélinisées ou amyéliniques ;
- ▶ la substance P, ou substance P.P.S., polypeptide apparenté à la bradykinine, et à l'origine de douleurs violentes en injection sous-cutanée.

▲ Fig. 1 : Les stimuli douloureux. Une lésion tissulaire provoque la libération locale de prostaglandines et de substance P au niveau de multiples cibles qui libèrent à leur tour des substances excitatrices : histamine (qui participe à l'oedème), sérotonine, bradykinine. Ces apports biochimiques augmentent la sensibilité des fibres nociceptives (d'après Mamo, 1978).

Mamo conclut qu'il n'existe pas de preuves absolues de la présence d'un intermédiaire chimique entre l'agression somatique et les récepteurs, mais qu'un tel processus est plus que probable au vu de la présence systématique de ces intermédiaires dans tous les processus douloureux.

Les récepteurs de la douleur

Classiquement, les récepteurs de la douleur sont identifiés aux terminaisons libres (Fig. 2). L'agent d'excitation est directement en contact avec la fibre nerveuse, contrairement à ce qui se passe au niveau des autres récepteurs de la sensibilité où s'interpose une formation organisée entre le stimulus et l'extrémité de la fibre.

Mamo indique qu'un deuxième caractère différentiel est fourni par la très grande densité des terminaisons libres qui s'insinuent entre les cellules du derme et de l'épiderme (Fig. 3). On en compte environ 200 par cm², formant des réseaux à mailles serrées, composées de ramifications issues de mêmes fibres et de fibres différentes dont les territoires d'innervation se recouvrent. Ces terminaisons sont reliées soit à des fibres amyéliniques, soit à des fibres myélinisées de faible calibre.

▲ Fig. 2 : La terminaison nerveuse libre. Les terminaisons nerveuses libres sont les neurites (prolongement du corps cellulaire d'un neurone), des neurones sensoriels qui viennent innervier leur cible comme l'épiderme et ne se terminent pas par une structure histologique particulière comme les autres récepteurs : tact, chaleur, etc.

▲ Fig. 3 : Les terminaisons libres. Les récepteurs de la douleur forment des réseaux à mailles serrées qui s'insinuent entre les cellules de l'épithélium et les fibres du tissu conjonctif. Ce sont les seuls récepteurs trouvés dans des zones particulièrement algiques.

La confirmation du rôle de ces terminaisons dans les processus douloureux réside dans le fait que des zones particulièrement sensibles à la douleur comme la pulpe dentaire ou la membrane tympanique sont uniquement pourvues de récepteurs à terminaison libre.

Il semblerait que les terminaisons libres ne soient pas uniquement des récepteurs de la douleur. Weddell (1961) par exemple, a montré que certaines zones innervées uniquement par des terminaisons libres étaient capables de percevoir l'ensemble des sensations connues. Lele et al (1959) ont montré que les récepteurs de la cornée étaient exclusivement des terminaisons libres, mais répondaient cependant à des stimulations mécaniques, thermiques ou douloureuses.

Mamo (1968) ajoute que les terminaisons libres reliées à des fibres de faible diamètre peuvent être considérées comme des récepteurs universels et que les récepteurs encapsulés sont d'autant plus spécialisés qu'ils appartiennent à des fibres de calibre plus élevé.

Les voies de la douleur

Il existe différents types de fibres nerveuses dont les terminaisons libres forment les nocicepteurs. Toutes relient les organes périphériques à la moelle épinière, mais leur diamètre diffère grandement, de même que l'épaisseur de la gaine de myéline qui entoure la fibre nerveuse ou axone.

Deux types de fibres servent de supports aux décharges nociceptives :

- les fibres A delta, myélinisées, de faible calibre (3 à 4 μm de diamètre), à conduction lente (2 à 6 m/s). Ces fibres assurent également la transmission de sensations d'origine mécanique ou thermique

- les fibres C, amyéliniques, de diamètre réduit (2 à 0,5 μm), à conduction très lente (0,6 à 2 m/s), qui représentent 80 % des fibres afférentes, ce qui ne peut les limiter qu'à la transmission des influx douloureux. Gasser (au nom bien connu des odontologistes...), dès 1929, leur attribuait un rôle dans la transmission des sensations thermiques et tactiles. Depuis, de nombreux auteurs ont reconnu le caractère plurisensitif des fibres de type C.

Les différentes vitesses de conduction des deux types de fibres nerveuses nociceptives (A-delta et C) expliquent la façon particulière dont on ressent la douleur lorsque l'on se blesse : d'abord une douleur aiguë, vive et précise qui fait place quelques secondes plus tard à une douleur plus diffuse et plus sourde. Ce délai provient de la vitesse de conduction différente des fibres A-delta et C qui fait que leur message n'atteint pas le cerveau exactement en même temps. Ce que l'on nomme la « douleur rapide » qui disparaît assez vite, vient de la transmission d'influx nerveux dans les fibres A-delta. La « douleur lente » plus persistante, est issue de la

stimulation des fibres C non myélinisée. On estime que ces dernières comptent pour environ 80 % des fibres nociceptives.

Les fibres A delta et C pénètrent dans la corne de la moelle en position latérale par rapport aux fibres de diamètre plus élevé et, d'une manière très schématique, la douleur dite « rapide » emprunte un circuit direct monosynaptique, alors que la douleur dite « lente » un circuit indirect polysynaptique permettant dès ce stade une filtration des sensations douloureuses (Fig. 4), selon la conception de Pearson (1952).

Les voies ascendantes nociceptives empruntent plusieurs voies d'origine évolutive plus ou moins anciennes comme les voies paléo- et néospinothalamiques afin de permettre la localisation et la connotation émotive désagréable de la douleur par le cerveau. Ce sont des neurones dits « spécifiques », exclusivement activés par des stimuli nociceptifs cutanés, mécaniques ou thermiques.

Mamo (1968) indique que les fibres conduisant les influx nociceptifs, après avoir fait relais dans les noyaux non-spécifiques du tronc cérébral, poursuivent leur route ascendante à travers les réseaux polysynaptiques de la formation réticulée, structure nerveuse du tronc cérébral qui intervient dans la régulation de grandes fonctions vitales (comme les cycles veille-sommeil), le contrôle d'activités motrices réflexes ou stéréotypées, comme la marche ou le tonus postural et dans des fonctions cognitives telles que l'attention. Cet auteur indique en conclusion que « la sensation douloureuse embrasera ainsi la presque totalité des formations nerveuses, mettant en cause l'individu tout entier ». Une régulation des stimuli nociceptifs s'avère donc indispensable au bon fonctionnement du corps humain.

▲ Fig. 4 : La première synapse. Les voies de la douleur dite « rapide », transportée par des fibres de calibre moyen, sont monosynaptiques, donc non régulées. Les voies de la douleur dite « lente », avec des fibres de petit calibre, subissent de nombreuses synapses dès leur entrée dans la corne postérieure de la moelle, laissant penser à un système de « filtre » de l'information douloureuse dès ce stade, en raison de la présence d'interneurones dont on sait que la plupart sont inhibiteurs (d'après Pearson, 1952).

RÉGULATION DE LA DOULEUR

Le cerveau ne constitue pas un récepteur passif de messages sensitifs, mais un véritable centre d'interprétation permettant des corrections constantes. Les informations douloureuses ne doivent plus être comprises comme un signal d'alarme primitif, mais comme des informations régulées en permanence non seulement dans la moelle épinière, mais également à différents niveaux dans le cerveau, faisant apparaître la notion de contrôle de la douleur par des voies descendantes. Le caractère éminemment

subjectif de la douleur et les nombreux facteurs psychologiques pouvant l'affecter trouvent ainsi une explication neuronale. Les voies nerveuses qui partent des centres supérieurs générant ces états psychologiques exercent leur influence sur des régions sous-corticales et sont donc forcément des voies descendantes. Celles-ci ont une influence inhibitrice qui, selon son degré d'activation, va « fermer la porte » à différents degrés dans les centres de relais des voies nociceptives ascendantes.

Différentes théories ont été avancées pour expliquer ce système de contrôle par les centres supérieurs.

Théorie de Noordenbos (1959)

Cette théorie est basée sur les modalités d'agencement du faisceau spinothalamique, figuré comme un vaste filet tendu de la moelle aux structures supérieures et dont les mailles sont formées de plusieurs neurones courts qui convergent sur le neurone suivant au niveau des « noeuds » du filet. Un neurone faisant partie du filet est incapable d'activer à lui seul les neurones suivants, plusieurs neurones sont nécessaires pour cela. Ce filet, en connexion avec les fibres C, comporte de nombreuses portes d'entrée et fonctionne comme un tout, en fonction du niveau de fond de l'ensemble des mailles. Une décharge nociceptive sera plus ou moins efficace suivant le niveau de fond. Le filet neuronal est soumis, à tous ses étages, à des processus d'inhibition qui résultent de l'action des fibres myélinisées sur les fibres amyéliniques (Fig. 5).

▲ Fig. 5 : **Théorie de Noordenbos**. Selon cette théorie, la corne postérieure de la moelle est constituée d'un vaste filet d'interneurones non myélinisés, sous la dépendance de fibres myélinisées régulant leur action. Un neurone ne peut être activé que par l'action combinée et simultanée de plusieurs autres neurones. (d'après Noordenbos, 1959)

Théorie de Melzack et Wall

Cette théorie, proposée en 1965, est basée sur certaines caractéristiques électro-physiologiques des fibres qui pénètrent dans la corne postérieure, sur leur organisation électro-fonctionnelle, sur leur agencement histologique et sur l'existence d'un système de contre-réaction central. Ces auteurs indiquent qu'en dehors de toute stimulation cutanée, il existe une activité de fond permanente au niveau des petites fibres (A-delta et C) en raison de l'adaptation lente des récepteurs, d'une post-décharge prolongée et d'une activité parfois spontanée. En revanche, les fibres de gros diamètre sont soit actives, soit totalement silencieuses. Ces 2 types de fibres pénètrent dans la corne postérieure de la moelle en entrent en connexion avec les cellules de la substance gélatineuse par des filets collatéraux. Les fibres de gros diamètre auront une influence soit excitatrice, soit inhibitrice sur les fibres de petit diamètre, créant ainsi une porte permettant ou non aux stimuli de passer, donnant son nom à cette théorie : le « gate control », ou contrôle de la porte (Fig. 6). C'est cette théorie qui est actuellement la plus « en vogue », tant sur le plan scientifique que sur le plan

▲ Fig. 6 : **Théorie du Gate Control**. Les fibres de gros diamètre G (a -bêta) et de petit diamètre P (A-delta, C) s'articulent avec le neurone central (T) en adressant des collatérales à la substance gélatineuse (SG) qui ouvre ou ferme la « porte », en relation avec les voies centrales et le système d'action (le muscle, dans le cas d'un mouvement réflexe). Le système de contrôle central se compose de fibres de gros diamètre qui acheminent très rapidement les informations vers les structures supérieures qui exercent à leur tour, par des voies descendantes, leur action sur le système de contrôle de seuil. L'inhibition de l'activité des petites fibres par l'activité des grosses fibres s'exerce donc à la fois directement à l'échelon de la corne postérieure, et indirectement par l'intermédiaire des structures centrales (d'après Melzack, Wall 1965).

didactique, son mécanisme d'action étant facile à comprendre, même si elle ne résout pas tous les problèmes.

L'hypnose, l'effet « placebo »

Du latin « je plairai », le terme placebo vient des protocoles visant à tester de nouveaux médicaments. Lors de ces tests pharmacologiques, on compare toujours deux groupes de patients pour voir si le médicament est efficace : un premier groupe qui reçoit le médicament, et un autre groupe qui reçoit une pilule en tout point semblable, mais ne contenant pas la molécule active du médicament, mais donnant l'impression qu'il reçoit lui aussi un véritable médicament. Il s'agit de ce que l'on peut qualifier d'une « auto-tromperie », car tout part de la conviction du patient que le traitement qui lui est administré sera efficace. Il en est de même pour l'hypnose, l'activité du cerveau déclenchant, par les voies descendantes, une inhibition des stimuli nociceptifs. La séquence d'activation de ces voies descendantes impliquerait des structures cérébrales comme le cortex préfrontal dorsolatéral (une région impliquée dans les prédictions sur la base de croyances...) qui, par l'entremise de connexions synaptiques utilisant les endorphines, rejoint le cortex cingulaire antérieur qui, lui, activerait finalement la substance grise péri-aqueducale, puis les noyaux du raphé et d'autres noyaux du tronc cérébral. Des modulations complexes vont survenir à chacun de ces sites, en plus de celles qui se produiront dans la corne dorsale de la moelle épinière beaucoup plus bas. C'est un phénomène extrêmement complexe et encore mal compris.

LA « DOULEUR-MALADIE »

Les douleurs occlusales chroniques sont souvent à l'origine de la « douleur-maladie », selon l'excellente formule de Boucher et Pionchon (2006) : « *Les douleurs chroniques accompagnant souvent des maladies au long cours, connues et traitées, sont assez bien contrôlées par le traitement antalgique. En revanche, les douleurs dites chroniques rebelles constituent une véritable maladie en soi. À la distinction classique douleur aiguë/douleur chronique, on pourra donc préférer les notions de douleur symptôme et de douleur maladie. L'expérience douloureuse envahit toute la vie du sujet et perdure même au-delà de la disparition de la lésion initiale.* ».

Cette douleur n'a alors plus aucune fonction, ni aucun objectif biologique, elle n'a plus de rôle de protection ni de signal : elle est devenue « maladie ». Elle va conditionner la vie de l'individu, entraîner des troubles de

l'appétit, une perte du sommeil, envahir son univers affectif, retentir sur le vécu quotidien avec des répercussions sociales, professionnelles et familiales. Elle va mobiliser la totalité des structures nerveuses et va devenir la préoccupation dominante. Ce n'est plus un mécanisme physio-pathologique issu des récepteurs sensitifs (Fig. 7) mais une maladie d'origine centrale, venant du cerveau. La douleur en tant que telle peut s'atténuer ou disparaître avec le temps, mais la maladie créée par la douleur se poursuit et reste la préoccupation principale du sujet (Fig. 8). C'est très souvent le cas des pathologies occlusales chroniques, rendant les patients qui en sont atteints difficiles, sinon impossibles, à soigner et surtout à guérir. Le recours à un traitement psychologique est un préalable indispensable à un éventuel traitement local (s'il est alors encore nécessaire...).

▲ Fig. 7 : La douleur vraie. Une douleur aiguë est liée à des entrées sensorielles nociceptives, entraînant des conséquences sociales passagères. Lorsque la douleur devient chronique, les facteurs psychosociaux prennent le pas sur les stimuli nociceptifs et la douleur devient « souffrance » (d'après Boucher et Pionchon, 2006).

▲ Fig. 8 : La douleur « maladie ». La douleur chronique finit par créer une douleur « maladie », autoentretenu par l'anticipation de la douleur qui crée en elle-même une situation douloureuse, au sens psychique du terme et amplifie la moindre stimulation dorigène. Cette maladie peut se prolonger même lorsque la douleur initiale a disparu (d'après Boucher et Pionchon, 2006).

APPRÉCIATION DE LA DOULEUR

La difficulté pour un praticien est d'apprécier la douleur d'un patient, surtout lorsqu'une origine occlusale est suspectée. Il doit en effet différencier ce qui est douleur réelle ou douleur psychogène afin d'appliquer un traitement symptomatique faisant éventuellement intervenir un psychologue ou même un psychiatre, ce qui n'est parfois pas évident à faire comprendre au patient concerné...

Il existe de nombreuses échelles d'évaluation de la douleur, surtout efficaces lorsque la douleur est aiguë. Par contre, lorsqu'elle est chronique, son appréciation devient difficile.

Boucher et Pionchon (2006) ont proposé un tableau permettant d'évaluer la douleur occlusale chronique, tableau mettant en évidence la nécessité d'un praticien « expérimenté » pour cette appréciation (Fig. 9). Un praticien débutant ne doit pas hésiter à référer un patient présentant des troubles chroniques issus de l'occlusion et installés depuis longtemps à un praticien plus expérimenté !

Lors de l'interrogatoire du patient, le praticien devra garder en mémoire l'excellente formule de

D. Rosencweig (1994) : « *Il est important de savoir quel événement le patient met en relation avec l'apparition des troubles* ».

CONCLUSION

La douleur, à laquelle est quotidiennement confronté le praticien, échappe à tout essai de codification physiologique et ne peut être emprisonnée dans un système neuronal bien défini. Mamo (1968) situe parfaitement bien ce problème : « *Nous avons personnellement le sentiment... que la douleur n'existe pas en tant que sensation physiologique et qu'elle fait tout entière partie de la pathologie. Son irruption dans le système nerveux constitue un événement franchement anormal qui utilise des circuits qui ne lui sont pas physiologiquement destinés. Cette mainmise sur le système nerveux par des impulsions aussi intenses que celles déclenchées par une stimulation nociceptive entraîne, à un degré plus ou moins important, des perturbations dans son fonctionnement normal, et ce sont ces perturbations qui seraient ressenties comme un état de souffrance somatique.* ».

On ne peut mieux conclure.

▲ Fig. 9 : Appréciation personnalisée de la douleur. L'évaluation d'une douleur chronique fait appel à de nombreux paramètres parmi lesquels le plus important semble être l'expérience du praticien... (d'après Boucher, Pionchon).

Bibliographie

- [1] **Boucher Y, Pionchon P.** Douleurs oro-faciales. *CdP édit*, Rueil Malmaison, 2006.
- [2] **Lele P P, Weddell G.** Sensory nerves of the cornea and cutaneous sensibility. *Exp Neurol* 1959 ; 1 : 334-359.
- [3] **Lund JP, Lavigne GJ, Dubner R, Sessle B.** Douleurs oro-faciales. *Quintessence édit*, Paris, 2004.
- [4] **Mamo H.** La douleur. *JB Baillière et fils édit*, Paris, 1968.
- [5] **Melzack R, Wall PD.** Pain mechanism; a new theory. *Science* 1965 ; 150 : 971-979.
- [6] **Noordenbos W.** Pain. *Elsevier Publ Co édit*, Amsterdam, 1959.
- [7] **Pearson AA.** Role of the gelatinous substance of the spinal cord in the conduction of pain. *Arch Neurol Psych* 1952 ; 68 : 515-529.
- [8] **Peschanski M.** Biologie de la douleur. *Le Rocher édit*, Paris, 1986.
- [9] **Weddell G.** Receptors of somatic sensation. *in Brain and behaviour*. *Brazier édit*, Washington, 1961.